目录

01 随机事件和概率

02 随机变量及其概率分布

03 多维随机变量及其分布

04 随机变量的数字特征

05 数理统计的基本概念

1.随机事件和概率

01 随机事件和概率

02 随机变量及其概率分布

03 多维随机变量及其分布

04 随机变量的数字特征

05 数理统计的基本概念

1.随机事件和概率

1.事件的关系与运算

(1) 子事件：$A \subset B$，若A发生，则B发生。

(2) 相等事件：$A = B$，即$A \subset B$，且$B \subset A$ 。

(3) 和事件：$A \cup B$（或$A + B$），A与B中至少有一个发生。

(4) 差事件：$A - B$，A发生但B不发生。

(5) 积事件：$A \cap B$（或AB），A与B同时发生。

(6) 互斥事件（互不相容）：$A \cap B = \varnothing$。

(7) 互逆事件（对立事件）： $A \cap B = \varnothing, A \cup B = \Omega, A = \overline{B}, B = \overline{A}$ 。

1.随机事件和概率

2.运算律

(1) 交换律：$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

(2) 结合律：$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$；　$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

(3) 分配律：$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

3.德.摩根律

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$　　$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

4.完全事件组

$A_1 A_2 \cdots A_n$两两互斥，且和事件为必然事件，即$A_i \cap A_j = \varnothing, i \neq j, \bigcup_{i=1}^{n} = \Omega$

1.随机事件和概率

5.概率的基本概念

(1) 概率：事件发生的可能性大小的度量，其严格定义如下：

概率$P(g)$为定义在事件集合上的满足下面3个条件的函数：

1)对任何事件A，$P(A) \geq 0$

2)对必然事件Ω，$P(\Omega) = 1$

3)对$A_1 A_2 \cdots A_n, \cdots$,若$A_i A_j = \varnothing (i \neq j)$，则：$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A)$.

1.随机事件和概率

(2) 概率的基本性质

1) $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$;

2) $P(A - B) = P(A) - P(AB)$;

3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

特别，当$B \subset A$时，$P(A - B) = P(A) - P(B)$且$P(B) \leq P(A)$;

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$

4) 若$A_1, A_2, \cdots, A_n$两两互斥，则$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n}(P(A_i)$

1.随机事件和概率

（3) 古典型概率: 实验的所有结果只有有限个， 且每个结果发生的可能性相同，其概率计算公式:

$$P(A)=\frac{\text{事件}A\text{发生的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}$$

(4) 几何型概率: 样本空间Ω为欧氏空间中的一个区域， 且每个样本点的出现具有等可能性，其概率计算公式:

$$P(A)=\frac{A\text{的度量(长度、面积、体积)}}{\Omega\text{的度量(长度、面积、体积)}}$$

1.随机事件和概率

6.概率的基本公式

(1) 条件概率: $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$,表示A发生的条件下，B发生的概率

(2) 全概率公式： $P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(A|B_i)P(B_i), B_iB_j=\varnothing, i\neq j, \bigcup_{i=1}^{n}B_i=\Omega.$

(3) **Bayes**公式:

$$P(B_j|A)=\frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^{n}P(A|B_i)P(B_i)}, j=1,2,\cdots,n$$

(4)乘法公式： $P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2|A_1)=P(A_2)P(A_1|A_2)$ $P(A_1A_2\cdots A_n)=$

$P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})$

1.随机事件和概率

7.事件的独立性

(1) A与B相互独立⇔ $P(AB) = P(A)P(B)$

(2) A，B，C两两独立 ⇔ $P(AB) = P(A)P(B); P(BC) = P(B)P(C); P(AC) = P(A)P(C);$

(3) A，B，C相互独立 ⇔ $P(AB) = P(A)P(B); P(BC) = P(B)P(C); P(AC) = P(A)P(C);$

$P(ABC) = P(A)P(B)P(C).$

1.随机事件和概率

8.独立重复试验

将某试验独立重复n次，若每次实验中事件A发生的概率为p，则n次试验中A发生k次的概率为：

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$$

9.重要公式与结论

(1) $P(\overline{A})=1-P(A)$

(2) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$$

(3) $P(A-B)=P(A)-P(AB)$

1.随机事件和概率

(4) $P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB), P(A) = P(AB) + P(A\overline{B})$，$P(A \cup B) = P(A) + P(\overline{A}B) = P(AB) + P(A\overline{B}) + P(\overline{A}B)$

(5) 条件概率$P(\cdot|B)$满足概率的所有性质，

例如：．$P(\overline{A}_1|B) = 1 - P(A_1|B)$ $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1A_2|B)$ $P(A_1A_2|B) = P(A_1|B)P(A_2|A_1B)$

(6) 若$A_1, A_2, \cdots, A_n$相互独立，则$P(\cap_{i=1}^{n} A_i) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i)$，$P(\cup_{i=1}^{n} A_i) = \prod_{i=1}^{n}(1 - P(A_i))$

1.随机事件和概率

(7) 互斥、互逆与独立性之间的关系： A与B互逆⇒A与B互斥，但反之不成立，A与B互斥（或互逆）且均非零概率事件⇒A与B不独立.

(8) 若$A_1, A_2, \cdots, A_m, B_1, B_2, \cdots, B_n$相互独立，则$f(A_1, A_2, \cdots, A_m)$与 $g(B_1, B_2, \cdots, B_n)$也相互独立，其中$f(\cdot), g(\cdot)$分别表示对相应事件做任意事件运算后所得的事件，另外，概率为1（或0）的事件与任何事件相互独立.

2.随机变量及其概率分布

01 随机事件和概率

02 随机变量及其概率分布

03 多维随机变量及其分布

04 随机变量的数字特征

05 数理统计的基本概念

2.随机变量及其概率分布

1.随机变量及概率分布

取值带有随机性的变量，严格地说是定义在样本空间上，取值于实数的函数称为随机变量，概率分布通常指分布函数或分布律

2.分布函数的概念与性质

定义： $F(x) = P(X \leq x), -\infty < x < +\infty$

性质：(1)$0 \leq F(x) \leq 1$　　(2)$F(x)$单调不减

(3)右连续$F(x+0) = F(x)$　　(4)$F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$

2.随机变量及其概率分布

3.离散型随机变量的概率分布

$P(X = x_i) = p_i, i = 1,2,\cdots,n,\cdots \qquad p_i \geq 0, \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$

4.连续型随机变量的概率密度

概率密度$f(x)$;非负可积，且:(1)$f(x) \geq 0$, (2)$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (3)x为$f(x)$的连续点，则:

$f(x) = F'(x)$分布函数$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

2.随机变量及其概率分布

5.常见分布

(1) 0-1分布:$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1$

(2) 二项分布:$B(n,p)$:　$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}, k=0,1,\cdots,n$

(3) **Poisson**分布:$p(\lambda)$:　$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \lambda>0, k=0,1,2\cdots$

(4) 均匀分布$U(a,b)$:　$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{b-a}, a<x<b \\ 0, \end{cases}$

2.随机变量及其概率分布

(5) 正态分布:$N(\mu,\sigma^2)$: $\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\sigma>0,-\infty<x<+\infty$

(6)指数分布:$E(\lambda)$: $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x},x>0,\lambda>0\\0,\end{cases}$

(7)几何分布:$G(p)$: $P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,0<p<1,k=1,2,\cdots.$

(8)超几何分布: $H(N,M,n)$: $P(X=k)=\frac{C_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n},k=0,1,\cdots,\min(n,M)$

2.随机变量及其概率分布

6.随机变量函数的概率分布

(1)离散型：$P(X=x_1)=p_i, Y=g(X)$

则: $P(Y=y_j)=\sum_{g(x_i)=y_i} P(X=x_i)$

(2)连续型：$X\ f_X(x), Y=g(x)$

则:$F_y(y)=P(Y\le y)=P(g(X)\le y)=\int_{g(x)\le y} f_x(x)dx$，　$f_Y(y)=F'_Y(y)$

2.随机变量及其概率分布

7.重要公式与结论

(1) $X\sim N(0,1)\Rightarrow \varphi(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\Phi(0)=\frac{1}{2},\Phi(-a)=P(X\leq -a)=1-\Phi(a)$

(2) $X\sim N(\mu,\sigma^2)\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1),P(X\leq a)=\Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$

(3) $X\sim E(\lambda)\Rightarrow P(X>s+t|X>s)=P(X>t)$

(4) $X\sim G(p)\Rightarrow P(X=m+k|X>m)=P(X=k)$

(5) 离散型随机变量的分布函数为阶梯间断函数；连续型随机变量的分布函数为连续函数，但不一定为处处可导函数。

(6) 存在既非离散也非连续型随机变量。

3.多维随机变量及其分布

01 随机事件和概率

02 随机变量及其概率分布

03 多维随机变量及其分布

04 随机变量的数字特征

05 数理统计的基本概念

3.多维随机变量及其分布

1.二维随机变量及其联合分布

由两个随机变量构成的随机向量(X,Y)， 联合分布为$F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)$

2.二维离散型随机变量的分布

(1) 联合概率分布律 $P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij};i,j=1,2,\cdots$

(2) 边缘分布律 $p_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}\,,i=1,2,\cdots\ p_{\cdot j}=\sum_{i}^{\infty}p_{ij}\,,j=1,2,\cdots$

(3) 条件分布律 $P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$ $P\{Y=y_j|X=x_i\}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$

3.多维随机变量及其分布

3. 二维连续性随机变量的密度

(1) 联合概率密度$f(x,y)$:

1) $f(x,y) \geq 0$ 2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy = 1$

(2) 分布函数：$F(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)dudv$

(3) 边缘概率密度：$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$ $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$

(4) 条件概率密度：$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

3.多维随机变量及其分布

4.常见二维随机变量的联合分布

(1) 二维均匀分布：$(x,y)\sim U(D)$,$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{S(D)},(x,y)\in D\\ 0,\ \text{其他}\end{cases}$

(2) 二维正态分布：$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}.\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

3.多维随机变量及其分布

5.随机变量的独立性和相关性

X和Y的相互独立:$\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$:

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\cdot}\cdot p_{\cdot j}$（离散型）　　$\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$（连续型）

X和Y的相关性:

相关系数$\rho_{XY}=0$时，称X和Y不相关， 否则称X和Y相关

3.多维随机变量及其分布

6.两个随机变量简单函数的概率分布

离散型： $P(X=x_i,Y=y_i)=p_{ij},Z=g(X,Y)$ 则：

$$P(Z=z_k)=P\{g(X,Y)=z_k\}=\sum_{g(x_i,y_i)=z_k}P\left(X=x_i,Y=y_j\right)$$

连续型： $(X,Y)\sim f(x,y),Z=g(X,Y)$ 则：

$$F_Z(z)=P\{g(X,Y)\le z\}=\iint_{g(x,y)\le z}f(x,y)dxdy,\quad f_Z(z)=F'_Z(z)$$

3.多维随机变量及其分布

7.重要公式与结论

(1) 边缘密度公式： $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy,\ f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$

(2) $P\{(X,Y)\in D\}=\iint_D f(x,y)dxdy$

3.多维随机变量及其分布

(3) 若(X,Y)服从二维正态分布$N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$ 则有：

1) $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

2) X与Y相互独立$\Leftrightarrow \rho=0$，即X与Y不相关。

3) $C_1X+C_2Y\sim N(C_1\mu_1+C_2\mu_2,C_1^2\sigma_1^2+C_2^2\sigma_2^2+2C_1C_2\sigma_1\sigma_2\rho)$

4) X关于Y=y的条件分布为：$N(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2),\sigma_1^2(1-\rho^2))$

5) Y关于$X=x$的条件分布为：$N(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),\sigma_2^2(1-\rho^2))$

3.多维随机变量及其分布

(4) 若X与Y独立，且分别服从$N(\mu_1,\sigma_1^2),N(\mu_1,\sigma_2^2)$, 则:

$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,0)$, $C_1X+C_2Y\sim N(C_1\mu_1+C_2\mu_2,C_1^2\sigma_1^2+C_2^2\sigma_2^2)$.

(5) 若X与Y相互独立，$f(x)$和$g(x)$为连续函数， 则$f(X)$和$g(Y)$也相互独立。

4.随机变量的数字特征

01 随机事件和概率

02 随机变量及其概率分布

03 多维随机变量及其分布

04 随机变量的数字特征

05 数理统计的基本概念

4.随机变量的数字特征

1.数学期望

离散型：$P\{X=x_i\}=p_i, E(X)=\sum_i x_i p_i$；

连续型：$X\sim f(x), E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

性质：

(1) $E(C)=C, E[E(X)]=E(X)$

(2) $E(C_1X+C_2Y)=C_1E(X)+C_2E(Y)$

(3) 若X和Y独立，则$E(XY)=E(X)E(Y)$ (4)$[E(XY)]^2\leq E(X^2)E(Y^2)$

4.随机变量的数字特征

2.方差：$D(X) = E[X - E(X)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$

3.标准差：$\sqrt{D(X)}$,

4.离散型：$D(X) = \sum_i [x_i - E(X)]^2 p_i$

4.随机变量的数字特征

5.连续型： $D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2 f(x)dx$

性质：

(1) $D(C)=0, D[E(X)]=0, D[D(X)]=0$

(2) X与Y相互独立，则$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$

(3) $D(C_1X+C_2)=C_1^2D(X)$

(4) 一般有 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2Cov(X,Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\rho\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$

(5) $D(X)<E(X-C)^2, C\neq E(X)$，(6) $D(X)=0\Leftrightarrow P\{X=C\}=1$

4.随机变量的数字特征

6.随机变量函数的数学期望

(1) 对于函数$Y = g(x)$

X为离散型：$P\{X = x_i\} = p_i, E(Y) = \sum_i g(x_i)p_i$；

X为连续型：$X \sim f(x), E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$

(2) $Z = g(X,Y)$;$(X,Y) \sim P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$

$E(Z) = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j)p_{ij}$ $(X,Y) \sim f(x,y)$

$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)dxdy$

4.随机变量的数字特征

7.协方差 $Cov(X,Y)=E[(X-E(X)(Y-E(Y))]$

8.相关系数 $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$,$k$阶原点矩 $E(X^k)$; k阶中心矩 $E\{[X-E(X)]^k\}$

性质:

(1) $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$,

(2) $Cov(aX,bY)=abCov(Y,X)$

(3) $Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$,

(4) $|\rho(X,Y)|\leq 1$

(5) $\rho(X,Y)=1\Leftrightarrow P(Y=aX+b)=1$, 其中$a>0$

$\rho(X,Y)=-1\Leftrightarrow P(Y=aX+b)=1$, 其中$a<0$

4.随机变量的数字特征

9.重要公式与结论

(1) $D(X) = E(X^2) - E^2(X)$

(2) $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

(3) $|\rho(X,Y)| \leq 1$,且 $\rho(X,Y) = 1 \Leftrightarrow P(Y = aX + b) = 1$，其中$a > 0$

$\rho(X,Y) = -1 \Leftrightarrow P(Y = aX + b) = 1$，其中$a < 0$

4.随机变量的数字特征

(4) 下面5个条件互为充要条件：

$$\rho(X,Y)=0 \Leftrightarrow Cov(X,Y)=0 \Leftrightarrow E(X,Y)=E(X)E(Y)$$

$$\Leftrightarrow D(X+Y)=D(X)+D(Y) \Leftrightarrow D(X-Y)=D(X)+D(Y)$$

注：X与Y独立为上述5个条件中任何一个成立的充分条件，但非必要条件。

5.数理统计的基本概念

01 随机事件和概率

02 随机变量及其概率分布

03 多维随机变量及其分布

04 随机变量的数字特征

05 数理统计的基本概念

5.数理统计的基本概念

1.基本概念

总体：研究对象的全体，它是一个随机变量，用X表示。

个体：组成总体的每个基本元素。

简单随机样本：来自总体X的n个相互独立且与总体同分布的随机变量$X_1, X_2 \cdots, X_n$，称为容量为n的简单随机样本，简称样本。

统计量：设$X_1, X_2 \cdots, X_n$,是来自总体X的一个样本，$g(X_1, X_2 \cdots, X_n)$）是样本的连续函数，且$g(\cdot)$中不含任何未知参数，则称$g(X_1, X_2 \cdots, X_n)$为统计量。

5.数理统计的基本概念

样本均值：$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

样本方差：$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$

样本矩：样本k阶原点矩：$A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k\,, k = 1,2,\cdots$

样本k阶中心矩：$B_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^k\,, k = 1,2,\cdots$

5.数理统计的基本概念

2.分布

χ^2分布：$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$，其中$X_1, X_2 \cdots, X_n$,相互独立，且同服从$N(0,1)$

t分布：$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$，其中$X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$,且$X$，$Y$ 相互独立。

F分布：$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$，其中$X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2)$,且$X$，$Y$相互独立。

分位数：若$P(X \leq x_\alpha) = \alpha$,则称$x_\alpha$为$X$的$\alpha$分位数。

5.数理统计的基本概念

3.正态总体的常用样本分布

(1) 设$X_1, X_2 \cdots, X_n$为来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的样本，

$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$,则:

1) $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 或者$\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$

2) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$

3) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$

4) $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

5.数理统计的基本概念

4.重要公式与结论

(1) 对于$\chi^2 \sim \chi^2(n)$，有$E(\chi^2(n)) = n, D(\chi^2(n)) = 2n$;

(2) 对于$T \sim t(n)$，有$E(T) = 0, D(T) = \frac{n}{n-2}(n > 2)$;

(3) 对于$F \sim F(m,n)$，有 $\frac{1}{F} \sim F(n,m), F_{a/2}(m,n) = \frac{1}{F_{1-a/2}(n,m)}$;

(4) 对于任意总体X，有 $E(\overline{X}) = E(X), E(S^2) = D(X), D(\overline{X}) = \frac{D(X)}{n}$

参考文献

1. https://github.com/fengdu78
2. 《概率论与数理统计》，同济大学